



သလ္လာကုမ္ပဏီ

သလ္လာကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် သလ္လာအထွေထွေ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း အမည်ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ သေးငယ်သော လုပ်ငန်းငယ်လေးတစ်ခုအနေဖြင့် အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်း အမျိုးမျိုး ကြားမှရှုန်းကန်၍ မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကြိုးစား ရပ်တည်ခဲ့ရပါသည်။

သလ္လာကုမ္ပဏီသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ Interchemie werken "De Adelaar" BV မှဆေးများကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မသိသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ဈေးနှုန်းမြင့်သော်လည်း အရည်အသွေးကို စိတ်ချယုံကြည်မှုဖြင့် တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း အသိုင်းအဝိုင်းတွင် Interchemie အမှတ်တံဆိပ်အနေဖြင့် အတန်အသင့် နေရာယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သလ္လာကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ရပ်တည်နိုင်ရန် အားပေးကြသော မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို အစဉ်ထာဝရ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

သလ္လာကုမ္ပဏီသည်

- ဆေးဝါးများကို အရည်အသွေး နှင့် ဈေးနှုန်း မျှတစွာ ရောင်းချပါသည်။
- အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်း အာမခံ ပါသည်။
- ကောင်းသတင်း ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးဖြင့် ရပ်တည်သွားပါမည်။

ဆက်သွယ်ရန်


သလ္လာကုမ္ပဏီလီမိတက်

အမှတ်-၆၂၊ သာယာကုန်းလမ်း
နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်
အင်းစိန်မြို့နယ်
ရန်ကုန်။

တယ်လီဖုန်း

၀၁ ၆၄၁ ၉၃၅
၀၉ ၇၃ ၂၂၂ ၃၄၆
၀၉ ၇၉၅ ၈၅၅ ၄၃၈
၀၉ ၄၅၂ ၂၆၆ ၃၃၀

E-mail: sales@tharnlar.com



Products and People you can rely on!





ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်များ

အမျိုးအမည်	ပါဝင်မှု	စာမျက်နှာ
အလီဆရိုလ်	Antibiotics and vitamins	၆
အမ်ပရိုကော့က်စ်	Amprolium hydrochloride/Sulfaquinolaxaline/Vitamins	၇
ကိုလီ-၄၈၀၀	Colistin sulphate	၈
ကိုလော့က်စန့်	Doxycycline hyclate / Colistin sulphate	၉
ဒိုင်မော့က်စန့်	Colistin sulphate / Amoxycillin trihydrate	၁၀
ဒေါက်စင်-၂၀၀	Doxycycline hyclate / Tylosin tartrate	၁၁
ဒေါက်စီ-၅၀၀	Doxycycline hyclate	၁၂
ဂယ်လီမစ်-၂၀၀	Erythromycin thiocyanate	၁၃
ဂျင်တာ-၂၀၀	Gentamycin sulphate	၁၄
ဂျင်တာဒေါက်စ်	Gentamycin sulphate / Doxycycline hyclate	၁၅
အင်တာထရင်-၄၈၀	Sulfadiazine / Trimethoprim	၁၆
လင်မော့က်စင်	Oxytetracycline hydrochloride	၁၇
မက်ခရိုလင်	Tylosin tartrate	၁၈
နီမိုဗစ်	Antibiotics and vitamins	၁၉
နီယိုမစ်-၇၀၀	Neomycin sulphate	၂၀

ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးရည်များ

အမျိုးအမည်	ပါဝင်မှု	စာမျက်နှာ
ကိုလက်စင်	Colistin sulphate / Trimethoprim	၂၂
ကိုလက်စီလ်	Colistin sulphate/ Enrofloxacin	၂၃
ကိုလီ-၂၄၀၀	Colistin sulphate	၂၄
ကိုလော့က်စန့်	Doxycycline hyclate / Colistin sulphate	၂၅
ဒေါက်စီဆောလ်	Doxycycline (as hyclate)	၂၆
အင်တာမက်တင်	Ivermectin	၂၇
အင်တာထရင်-၄၈၀	Sulfadiazine / Trimethoprim	၂၈
မက်ခရိုတိုင် - ၂၅၀	Tilmicosin	၂၉



ထိုးဆေးများ

အမျိုးအမည်	ပိတ်မှု	တမျက်နှာ
ဘိုင်အိုစီလင်-၁၅၀	Amoxycillin base	၃၂
ဗျူတာဆာလ်-၁၀၀	Butafosfan / Cyanocobalamin	၃၃
ဖလူကိုနစ်-၃၄၀	Nitroxinil	၃၄
ဂျင်တာ-၁၀၀	Gentamycin base	၃၅
ဂလူးကော်တင်-၂၀	Dexamethasone base	၃၆
အင်တာဖလောက်စ်-၁၀၀	Enrofloxacin	၃၇
အင်တာမက်တင်	Ivermectin	၃၈
အင်တာထရင်	Sulfamethoxazole / Trimethoprim	၃၉
အင်ထရာဗာ-၁၀၀ ဘီ၂	Iron / Cyanocobalamin	၄၀
အင်ထရိုဗစ်	Vitamins	၄၁
အင်ထရိုဗစ်-ဘီ-ကွန်ပလက်စ်	B vitamins	၄၂
အင်ထရိုဗစ်-အီး-စီလင်	Vitamin E / Sodium selenite	၄၃
ကီတိုဆောလ်-၁၀၀	Ketoprofen	၄၄
လင်မောက်စင်-၅၀	Oxytetracycline base	၄၅
လင်မောက်စင်-၂၀၀ အယ်လ်အေ	Oxytetracycline base	၄၆
မက်ခရိုလင်-၂၀၀	Tylosin base	၄၇
ပင်စထရက်-၄၀၀	Procaine pen.G/Benzathine pen.G/Dihydrostreptomycin	၄၈
ပရိုကာဗင် အယ်လ်အေ	Procaine and benzathine penicillin G	၄၉
ဗစ်တော-၁၄၀	Vitamin A, D ₃ and E	၅၀
ဖိုင်လာ	Xylazine base	၅၁



ရေဖျော်အားဆေးမှုန့်များ

အမျိုးအမည်	ပါဝင်မှု	စာမျက်နှာ
အင်ထရိုဗစ် အေ+	Vitamins, minerals and amino acids	၅၄
အင်ထရိုဗစ်-အီးအက်စ်-၂၀၀	Vitamin E / Sodium selenite	၅၅
စထရက်မစ်	Vitamins and minerals	၅၆

ရေဖျော်အားဆေးရည်များ

အမျိုးအမည်	ပါဝင်မှု	စာမျက်နှာ
အမိနိုဂရိုး	Amino acids	၅၈
ဘီတာဆောလ်-စီ	Betaine, vitamine C and minerals	၅၉
ကယ်စီမင်	Calcium, vitamine D ₃ and magnesium	၆၀
အလက်ထရိုဆောလ်	Electrolytes	၆၁
အင်တာတောနစ်	Sorbitol, amino acids and vitamins	၆၂
အင်ထရိုချစ်	Vitamins and amino acids	၆၃
အင်ထရိုဗစ် အေ+	Vitamins and amino acids	၆၄
အင်ထရိုဗစ် - ဘီ - ကွန်ပလက်စ်	Vitamins B and C	၆၅
အင်ထရိုဗစ်-အီးအက်စ်-၁၀၀	Vitamin E / Sodium selenite	၆၆
နျူထရိုဆောလ်	Minerals, organic and amino acids	၆၇
စတီမိုဆောလ်	Yeast extract, B vitamins, acids and minerals	၆၈
စထရက်ဆောလ်	Vitamins, amino acids and minerals	၆၉
ဗစ်တော-၈၆	Vitamins A, D ₃ and E	၇၀



အထွေထွေသုံးဆေးများ

အမျိုးအမည်	ပါဝင်မှု	စာမျက်နှာ
နို့အုံရောင်ကုသဆေး ဘိုင်အိုဆိုင်စင်-အမ်	Amoxicillin trihydrate / Neomycin sulphate	၇၂
ကပ်ပါးရောဂါကုထိုးဆေး ထရစ်ပိုနေ	Diminazene aceturate / Phenazone	၇၃
အနာဖျန်းဆေး လင်မောက်စင်-၂၅	Oxytetracycline hydrochloride	၇၄

ခြံသုံးပိုးသတ်ဆေးများ

အမျိုးအမည်	ပါဝင်မှု	စာမျက်နှာ
အက်စစ်-၄၀၀	Quaternary ammonium compounds/Glutaraldehyde	၇၆
အက်စွန်-၁၀၀	Potassium peroxymonosulphate	၇၇
ဆေးအာနိသင်ကုန်ဆုံးမည့်ရက် တွက်ချက်မှုစံညွှန်းများ		၇၈ - ၇၉ ၇၉



ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်များ





Aliseryl WS

အလီဆရီလ်
(ဥတိုးအားဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Erythromycin thiocyanate.....	35 mg.
Oxytetracycline hydrochloride.....	50 mg.
Streptomycin sulphate.....	35 mg.
Colistin sulphate.....	200 000 IU.
Vitamin A, retinol-acetate.....	3 000 IU.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol.....	1 500 IU.
Vitamin E, α-tocopherol acetate.....	2 mg.
Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride.....	2 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavin.....	4 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride.....	2 mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin.....	10 µg.
Vitamin C, ascorbic acid.....	20 mg.
Ca -pantothenate.....	10 mg.
Vitamin K ₃ , menadione sodium bisulphate.....	2 mg.
Nicotinamide.....	20 mg.
Inositol.....	1 mg.
Excipients ad.....	1 g.

ဆေးညွှန်း

အစွမ်းထက်သော ပဋိဇီဝ ဆေး (၄) မျိုးနှင့် ဗစ်တာမင် (၁၂) မျိုး ပေါင်းစပ်ထားသော ဆေးဖြစ်သည်။
အောက်ပါတို့အတွက် သုံးနိုင်ပါသည်။

- ဥတိုးရန်၊ ကြီးထွားနှုန်းတိုးရန် နှင့် အသားတိုးနှုန်း ကောင်းမွန်ရန်။
- ရောဂါဝင်ရောက်ချိန်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများသော ရာသီပြောင်းချိန်၊ ကာကွယ်ဆေးပေးချိန်၊
ခြံရွှေ့ပြောင်းချိန်၊ အစာအကူးအပြောင်းအချိန်။
- အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ ဥပမာ-အီးကိုလီ၊ ဝမ်းကျ။
- အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ ဥပမာ-စီ-အာ-ဒီ၊ ကော်ရီအာ။
- ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများ

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်၊ ဝက်	ကာကွယ်ခြင်း	ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၂ လီတာ ၅ - ၇ ရက်။
ကြက်၊ ဝက်	ကုသခြင်း	ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁ လီတာ ၅ - ၇ ရက်။
နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်		ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၅ ကီလို ၅ - ၇ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ ဂရမ်





Amprocox WS
အမ်ပရိုကော့က်စ်
(ရေဖျော်သွေးဝမ်းကုသဆေးဖွန့်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Amprolium hydrochloride.....	200 mg.
Sulfaquinoxaline	150 mg.
Vitamin A, retinol-acetate.....	15 000 IU.
Vitamin K3.....	5 mg.
Excipients ad	1 g.

ဆေးညွှန်း

အမ်ပရိုကော့က်စ် ရေဖျော်သွေးဝမ်းဆေးသည် ကပ်ပါးကောင်ကြောင့်ဖြစ်သော သွေးဝမ်းရောဂါပိုး အား လုံး ကို နှိမ်နင်းပါသည်။ အထူးသဖြင့် အဖြစ်များသော Eimeria tenella (အူပိတ်သွေးဝမ်းပိုး) နှင့် Eimeria necatrix (အူသိမ်သွေးဝမ်းပိုး) တို့ကို ကောင်းစွာ ကုသနိုင်ပါသည်။

အမ်ပရိုကော့က်စ် ရေဖျော်သွေးဝမ်းဆေးသည်ကပ်ပါးကောင်ကြောင့်ဖြစ်သော သွေးဝမ်းရောဂါပိုးအပြင် ဂရမ် (+) နှင့် ဂရမ် (-) ဘက်တီးရီးယား များကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

ကြက်၊ နွားငယ်နှင့် သိုး၊ ဆိတ်တို့တွင် ကပ်ပါးကြောင့်ဖြစ်သော သွေးဝမ်းရောဂါများ ကုသနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ ဆိတ် နှင့် သိုး ကာကွယ်ခြင်း ဆေး ၁ ဂရမ်ကို ကိုယ်အလေးချိန် ၅၀-၁၀၀ကီလိုနွန်း ရေ (သို့မဟုတ်) နို့တွင်ဖျော်ပြီး ၂၁ ရက် တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ ဆိတ် နှင့် သိုး ကုသခြင်း ဆေး ၅ ဂရမ်ကို ကိုယ်အလေးချိန် ၂၅.၅၀ ကီလိုနွန်း ရေ (သို့မဟုတ်) နို့တွင်ဖျော်ပြီး ၅ ရက်တိုက်ရန်။

ကြက် ဆေး ၂၀ ဂရမ်ကို ရေ ၂၀-၄၀ လီတာနွန်း ၅ ရက် မှ ၇ ရက်တိုက်ရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ ဂရမ်





Coli-4800 WS

ကိုလီ-၄၈၀၀
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်
Colistin sulphate..... 4 800 000 IU.
Excipients ad 1 g.

ဆေးညွှန်း

ကိုလီ-၄၈၀၀ ဆေးသည် အူလမ်းကြောင်းမှ စုပ်ယူမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဆေးအာနိသင်မှာအစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတလျှောက် အစမှအဆုံး ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိသဖြင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ အခြားပဋိဇီဝဆေးများနှင့် ပေါင်းစပ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးများကို ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။ အီး-ကိုလီ၊ ကော်ရီဖာနှင့် အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ အတွက်သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၄ - ၈ လီတာ ၅ - ၇ ရက် တိုက်ရန် (သို့မဟုတ်)
ဆေး ၁ ကီလို အစာ ၂ - ၄ တန် ၅ - ၇ ရက် ရောစပ် ကျွေးရန်။

နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်

ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၈၀ ကီလို ၁ ရက် ၂ ကြိမ် ၅ - ၇ ရက်တိုက်ရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





Coloxan WS
ကိုလောက်စန်
 (ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Doxycycline hyclate	100 mg.
Colistin sulphate.....	1200 000 IU.
Excipients ad	1 g.

ဆေးညွှန်း

ကိုလောက်စန်တွင် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းနှင့် ကိုလက်စတင်ပဋိဇီဝဆေး (၂) မျိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းသည် အူလမ်းကြောင်းမှ စုပ်ယူမှုအတူးကောင်း မွန်သည့်အပြင် အဆုတ်သို့ရောက်ရှိ မှုကောင်းသည့်အတွက် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းကို စီ-အာ-ဒီ၊ ကော်ရီဇာကိုသို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ များ၊ အီး-ကိုလီ၊ ဝမ်းကျက်သို့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများကို ကုသနိုင်သည်။ ကိုလီစတင်သည် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းစာလျှောက် ဖြည်းညှင်းစွာ စိမ့်ဝင်မှုကြောင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ထိရောက်စွာ ပျောက်ကင်းစေသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ် ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၁ ရက် ၂ ကြိမ် ၄-၅ ရက်။

ကြက်၊ ဝက် ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁ - ၂ လီတာ ၄ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ ဂရမ် / ၁၀၀၀ ဂရမ်





Dimoxan WS

ဒိုင်မောက်စန်
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Colistin sulphate	1 200 000 IU.
Amoxicillin trihydrate	200 mg.
Excipients ad	1 g.

ဆေးညွှန်း

ဒိုင်မောက်စန်သည် အစွမ်းထက်သော ကိုလီစတင်ဆာလ်ဖိတ်နှင့် အမောက်စီစလင် ၂မျိုးပေါင်းစပ်ထားပြီး ဂရမ် (+) နှင့် ဂရမ် (-) ဘက်တီးရီးယားများကို နှိမ်နင်းနိုင်သော ဆေးဖြစ်သည်။ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကုသရာတွင်သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ ဆိတ် နှင့် သိုး ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၅ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို ၁ ရက် ၂ ကြိမ် ၃ - ၅ ရက်။
ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁ - ၂ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ ဂရမ် / ၁၀၀၀ ဂရမ်





Doxin-200 WS
ဒေါက်စင်-၂၀၀
 (ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်	
Doxycycline hyclate.....	100 mg.
Tylosin tartrate.....	100 mg.
Excipients ad	1 g.

ဆေးညွှန်း

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း တလျှောက် ထိရောက်သော တိုင်လိုစင် နှင့် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်း ပဋိဇီဝဆေး ၂ မျိုးကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါများ အတွက် အထူးအစွမ်းထက်မြက်ပါသည်။ ဆေးတိုက်ခြင်းကြောင့် ဝမ်းအနည်းငယ်ပျက်နိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်၊ ဂက်

နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁ - ၂ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ဆေး ၅ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ်
 ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ ဂရမ် / ၁၀၀၀ ဂရမ်





Doxy-500 WS

ဒေါက်စီ-၅၀၀
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်
Doxycycline hyclate 500 mg.
Excipients ad 1 g.

ဆေးညွှန်း

ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းသည်တက်ထရာဆိုင်ကလင်းအုပ်စုဝင်ပဋိဇီဝဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေသော တက်ထရာဆိုင်ကလင်းအုပ်စုဝင်များဖြစ်သည့်
အောက်စီတက်ထရာဆိုင်ကလင်း၊ ကလိုတက်ထရာဆိုင်ကလင်း တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်း
သည် အူလမ်းကြောင်းမှ စုပ်ယူမှုအထူး ကောင်းမွန်သည့်အပြင် ထူးခြားချက်တရပ်အနေဖြင့် အဆုတ်သို့
ရောက်ရှိမှု ကောင်းသည့်အတွက် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းကို စီ-အာ-ဒီ၊ ကော်ရီဇာ ကဲ့သို့ အသက်ရှူလမ်း
ကြောင်းရောဂါများ၊ အီး-ကိုလီ၊ ဝမ်းကျ ကဲ့သို့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောဂါများကို ထိရောက်စွာကု
သနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်၊ ဝက် ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၅ - ၁၀ လီတာ ၃ - ၅ ရက် တိုက်ရန်။
ခွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ် ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ်
၃ - ၅ ရက်တိုက်ရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





Gallimix-200 WS
 ဂယ်လီမစ်-၂၀၀
 (ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်
 Erythromycin thiocyanate 200 mg.
 Excipients ad 1 g.

ဆေးညွှန်း

ဂယ်လီမစ်-၂၀၀ ရေဖျော်ဆေးသည် နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ စီအာဒီ (CRD) ကို အထူး ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။ အခြားကြက်ရောဂါများဖြစ်သည့် ခြေဆစ်ယောင်ခြင်း၊ ကော်ရီဇာ (Coryza) ကြက်ပမ်းကျ နှင့် အဆုတ်အအေးမိရောဂါများကို ကုသနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁ လီတာနှုန်း ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





Genta-200 WS

ဂျင်တာ-၂၀၀
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်
Gentamycin sulphate 200 mg.
Excipients ad 1 g.

ဆေးညွှန်း

အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါများကို ကုသရာတွင်သုံးနိုင်ပါသည်။
အီးကိုလီ ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ၊ဝမ်းကျရောဂါ၊ဆဲလ်မှီနဲလား ရောဂါများကိုကုသရာတွင်သုံးစွဲနိုင်ပါ
သည်။ ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်း နှင့် တွဲဘက်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်
သည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်

နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်၊ ဝက်

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၂ လီတာ ၄ - ၅ ရက် တိုက်ရန်။

ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို တစ်ရက်
၂ ကြိမ် ၂ - ၄ ရက်တိုက်ရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





Gentadox WS
ဂျင်တာဒေါက်စ်
 (ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Doxycycline hyclate	100 mg.
Gentamicin sulphate	50 mg.
Excipients ad	1 g.

ဆေးညွှန်း

ဂျင်တာမိုင်းစင်သည် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါများကို ကုသရာတွင် သုံးနိုင်ပါသည်။ အီး-ကိုလီကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ ဝမ်းကျရောဂါ များ၊ ဆဲလ်မိုနိုလာရောဂါများကို ကုသရာတွင် သုံးစွဲ နိုင်ပါသည်။ ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်သည် အူလမ်းကြောင်းမှ စုပ်ယူမှု အထူးကောင်းမွန်သည့်အပြင် ထူးခြားချက်တရပ်အနေဖြင့် အဆုတ်သို့ရောက်ရှိမှု ကောင်းသည့်အတွက် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းကို စီ-အာ-ဒီ၊ ကော်ရီဇာကိုသို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါများ၊ အီး-ကိုလီ၊ ဝမ်းကျ ကဲ့သို့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောဂါများကို ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်ပါသည်။

ဂျင်တာဒေါက်စ်သည် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းနှင့် ဂျင်တာမိုင်းစင် တွဲဖက်ထားခြင်းကြောင့် ရောဂါပိုးများကို ပိုမိုထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်
 ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၁ ရက် ၂ ကြိမ် ၃ - ၅ ရက်။
 ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ ဂရမ် / ၁၀၀၀ ဂရမ်





Intertrim-480 WS

အင်တာထရင်-၄၈၀
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Sulfadiazine	400 mg.
Trimethoprim	80 mg.
Excipients ad	1 g.

ဆေးညွှန်း

ကော်ရီဇာ၊ အီး-ကိုလီ၊

ဝမ်းကျရောဂါ၊ဆဲလ်မှိုန့်လားကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ၊ ခြေဆစ်ရောင်ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်၊ ဝက်

နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁.၅ - ၂.၅ လီတာ ၄ - ၇ ရက်။

ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ၄ - ၇ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





Limoxin WS
လင်မောက်စင်
 (ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်
 Oxytetracycline hydrochloride 1000 mg.

ဆေးညွှန်း

အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများ ကုသနိုင်သည်။ ကော်ရီဇာ၊ အီး-ကိုလီ၊ စီအာဒီ၊ တိုက်ဖိုက်၊ မြေဆစ်ရောင်ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၂.၅ - ၅ လီတာ ၃ - ၅ ရက် တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်

ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၅၀- ၁၀၀ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ၃ - ၅ ရက် တိုက်ရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





Macrolan WS

မက်ခရိုလင်
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Tylosin tartrate..... 1000 mg.

ဆေးညွှန်း

အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများကုသနိုင်သည်။

စီးအာဒီ၊ ပမ်းကျရောဂါ၊ မြေဆစ်ရောင်ရမ်းနာရောဂါများကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်း၊ ကိုလီစတင်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးခြင်းဖြင့် ဆေးစွမ်းပိုမို ထက်မြက်စေပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁.၅ - ၂ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ပက်

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၃ - ၄ လီတာ ၅ - ၇ ရက်။

နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်

ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၄၄ - ၅၀ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ၅ - ၇ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၅၀၀ ဂရမ်





Nemovit WS

နီမိုဗစ်
(ဥတိုးအားဆေးမှုန့်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Oxytetracycline hydrochloride	60 mg.
Neomycin sulphate	40 mg.
Vitamin A, retinol-acetate	7 500 IU.
Vitamin D3, cholecalciferol	1 500 IU.
Vitamin E, α tocopherol acetate.....	5 mg.
Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride	1 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavin	2 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	2 mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin	7.5 µg.
Vitamin C, ascorbic acid	25 mg.
Ca-Pantothenate	7.5 mg.
Vitamin K ₃ , menadione sodium bisulphite	5 mg.
Nicotinamide.....	15 mg.
Folic acid	0.3 mg.
Methionine	30 mg.
Lysine	50 mg.
Excipients ad	1 g.

ဆေးညွှန်း

အစွမ်းထက်သောပဋိဇီဝဆေး ၂ မျိုး၊ ဗစ်တာမင် ၁၂ မျိုး၊ အမိနီအက်စစ် ၂ မျိုး ပေါင်းစပ်ထားသော ဆေးဖြစ်သည်။

- ဥတိုးရန်၊ ကြီးထွားနှုန်းနှင့် အသားတိုးနှုန်းကောင်းမွန်ရန်။
- ရောဂါဝင်ရောက်ချိန်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများသော ရာသီပြောင်းချိန်၊ ကာကွယ်ဆေးပေးချိန်၊ ခြံ့ရွှေ့ပြောင်းချိန်၊ အစာအကူးအပြောင်းအချိန်။
- အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ ဥပမာ-အီးကိုလီ၊ ဝမ်းကျ။
- အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ ဥပမာ-စီ-အာ-ဒီ၊ ကော်ရီဇာ။
- ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများ
- ကြက်ငယ်များစတင်အနွေးပေးချိန်တွင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်၊ ဝက်	ကာကွယ်ခြင်း	ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၂ လီတာ ၅ - ၇ ရက်။
ကြက်၊ ဝက်	ကုသခြင်း	ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၁ လီတာ ၅ - ၇ ရက်။
နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်		ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၅ ကီလို ၅ - ၇ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





Neomix-700 WS

နီယိုမစ်-၇၀၀
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Neomycin sulphate 700 mg.

Excipients ad 1 g.

ဆေးညွှန်း

နီယိုမစ်ဆေးသည် E-coli, Salmonella နှင့် Campylobacter spp အစရှိသည့်ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်သောအစွမ်းရှိသည့်ဆေးဖြစ်သည်။ နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်နှင့်ကြက်များတွင်ဘက်တီးရီးယား များ ကြောင့်ဖြစ်ပွားတတ်သည့် အူလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ကုသနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်
ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၁ ဂရမ်ကိုယ်အလေးချိန် ၇၀ ကီလို ၃-၅ ရက်တိုက်ရန်။

ဆေး ၃၀၀ ဂရမ်ကို ရေ ၂၀၀၀ လီတာ ၃-၅ ရက်တိုက်ရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးရည်များ





Colexin Pump

ကိုလက်စင်
(ပဋိဇီဝတိုက်ဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Colistin sulphate 200 000 IU.
Trimethoprim 50 mg.
Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

ကိုလက်စင်ကို ဘက်တီးရီးယားများကြောင့်ဖြစ်သောအစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများအတွက် သုံးနိုင်ပါသည်။

တိရစ္ဆာန်ငယ်များ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော့ဖြစ်ပါက အထူးသင့်လျော်ပါသည်။

ဆေးချိန်

တိုက်ကျွေးရန်။

ဆိတ်ငယ်၊ သိုးငယ် ကိုယ်အလေးချိန် ၂.၅ - ၃ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ၃ ရက် တိုက်ရန်။
ဂက်ငယ် ကိုယ်အလေးချိန် ၁ - ၃ ကီလို တစ်ရက် ၁ ကြိမ် ၃ ရက် တိုက်ရန်။
ဂက်ငယ် ကိုယ်အလေးချိန် ၃ - ၅ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ၃ ရက် တိုက်ရန်။

တစ်ကြိမ် တိုက်လျှင် ဆေးဘူးတွင်ပါသော မောင်းတံကို တစ်ကြိမ်ဖိပေးရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Colexil Oral

ကိုလက်စီလ်

(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁စီစီတွင်

Colistin sulphate	1 200 000 IU.
Enrofloxacin	100 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

အစွမ်းထက်သော ကိုလီစတင် နှင့် အမ်ရိုဖလောက်စစင် ပဋိဇီဝဆေး (၂) မျိုးပေါင်းစပ်ထားသော ဆေး ဖြစ်သည်။
 ဂရမ် (+) နှင့် ဂရမ် (-) ဘက်တီးရီးယား နှစ်မျိုးစလုံးကိုနှိမ်နင်းနိုင်သည်။ ကြက်နှင့်ဝက်များတွင် ဖြစ်ပွား တတ်သော Campylobacter, E. Coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella နှင့် Salmonella အစရှိသည့် ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်သော အစွမ်းရှိသည့် ဆေးဖြစ်ပါသည်။
 အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများ ကိုသက်သာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်	ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၂ လီတာ ၃ ရက် မှ ၅ ရက်။
ဝက်	ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၃ လီတာ ၃ ရက် မှ ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Coli-2400 Oral

ကိုလီ-၂၄၀၀
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Colistin sulphate 2 400 000 IU.

Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

ကိုလီ-၂၄၀၀ ဆေးသည်အူလမ်းကြောင်းမှစုပ်ယူမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဆေးအာနိသင်မှာအစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတလျှောက် အစမှအဆုံး ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိသဖြင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း

ရောဂါများ အတွက်အထူး သင့်လျော်ပါသည်။

အီး-ကိုလီ၊ ကော်ရီဇာနှင့် အစာအိမ်အူ လမ်းကြောင်းရောဂါများ အတွက်သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်
ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၁ ရက် ၂ ကြိမ် ၅-၇ ရက်။
ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၂-၄ လီတာ ၅-၇ ရက်တိုက်ရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Coloxan Oral
ကိုလောက်စန်
 (ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Doxycycline hyclate	100 mg.
Colistin sulphate.....	1200 000 IU.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

ကိုလောက်စန်တွင် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းနှင့် ကိုလက်စတင်ပဋိဇီဝဆေး (၂) မျိုးဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းသည် အူလမ်းကြောင်းမှ စုပ်ယူမှုအထူးကောင်း မွန်သည့်အပြင် အဆုတ်သို့ရောက်ရှိ မှုကောင်းသည့်အတွက် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းကို စီ-အာ-ဒီ၊ ကော်ရီဇာကဲ့သို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ များ၊ အီး-ကိုလီ၊ ဝမ်းကျက်သို့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများကို ကုသနိုင်သည်။ ကိုလီစတင်သည် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းတလျှောက် ဖြည်းညှင်းစွာ စိမ့်ဝင်မှုကြောင့် အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ထိရောက်စွာ ပျောက်ကင်းစေသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်	ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၁ ရက် ၂ ကြိမ်	၄ - ၅ ရက်။
ကြက်	ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၂ လီတာ	၄ - ၅ ရက်။
ဂက်	ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၁ လီတာ	၄ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Doxysol Oral
ဒေါက်စီ ဆောလ်
 (ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်
 Doxycycline (as hyclate)100 mg
 Excipients ad1 ml

ဆေးညွှန်း

ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းသည် တက်ထရာဆိုင်ကလင်းအုပ်စုဝင်ပဋိဇီဝဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
 မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေသော တက်ထရာဆိုင်ကလင်းအုပ်စုဝင်များဖြစ်သည့်
 ဒေါက်စီတက်ထရာဆိုင်ကလင်း၊ ကလိုတက်ထရာဆိုင်ကလင်း တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒေါက်စီဆိုင်က
 လင်းသည် အူလမ်းကြောင်းမှ စုပ်ယူမှု အထူးကောင်းမွန်သည့်အပြင် ထူးခြားချက်တရပ်အနေဖြင့်
 အဆုတ်သို့ရောက်ရှိမှု ကောင်းသည့်အတွက် ဒေါက်စီဆိုင်ကလင်းကို စီ-အာ-ဒီ၊ ကော်ရီဇာ ကဲ့သို့
 အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါများ၊ အီး-ကိုလီ၊ ပမ်းကျ ကဲ့သို့ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောဂါများကို
 ထိရောက်စွာကုသနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက် ဆေး ၀.၁-၀.၂ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
 ဝက် ဆေး ၀.၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလို ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Intermectin Oral

အင်တာမက်တင်

(ရေဖျော်ကပ်ပါးရောဂါကုဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Ivermectin..... 0.8 mg.

Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

တိရစ္ဆာန်များတွင်ဖြစ်သော အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းသန်ကောင်၊ အဆုတ်သန်ကောင်စွဲကပ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေပြား ပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားသော လှေး၊ သန်း၊ ဝဲစွဲခြင်း တို့ကိုကုသနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်

နှား၊ဆိတ်၊သိုး

ဆေး ၁ စီစီကို ကိုယ်အလေးချိန် ၂.၅ မှ ၃ ကီလို

ဆေး ၁ စီစီကိုကိုယ်အလေးချိန် ၄ ကီလို

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Intertrim-480 Oral

အင်တာထရင်-၄၈၀
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Sulfadiazine	400 mg
Trimethoprim	80 mg
Excipients ad	1 ml

ဆေးညွှန်း

ကော်ရီဇာ၊ အီးကို လီ၊ ပမ်းကျရောဂါ၊ ဆဲလ်မိုနိုလားကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ၊ ခြေဆစ်ရောင်ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ ဆိတ်ငယ်၊ သိုးငယ်
ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၁ ရက် ၂ ကြိမ် ၄-၇ ရက်။
ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၁.၅ - ၂.၅ လီတာ ၄-၇ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Macrotyl-250 Oral

မက်ခရိုတိုင်း - ၂၅၀
(ရေဖျော်ပဋိဇီဝဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Tilmicosin (as tilmicosin phosphate) 250 mg.
Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

မက်ခရိုတိုင်း - ၂၅၀ ရေဖျော်ဆေးရည်သည် အဖြစ်များသော စီ-အာ-ဒီ (CRD) ရောဂါအတွက် အထူး သင့်လျော်ပါသည်။ မက်ခရိုတိုင်း - ၂၅၀ ကို Mycoplasma spp., Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes, Mannheimia haemolytica ကြောင့်ဖြစ်သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါများကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ကုသရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ P.multocida ကြောင့်ဖြစ်သော ကြက်ဝမ်းကျ ရောဂါကိုလည်း ထိရောက်စွာ ကုသနိုင်ပါသည်။ မက်ခရိုတိုင်း - ၂၅၀ ကို တိုင်လိုစင်၊ တိုင်ရာမျူလင်၊ လင်ကိုမိုင်စင် တို့နှင့် တွဲမသုံးရပါ။ ဆေးတိုက်ကျွေးစဉ် ရေသောက်နှုန်း ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်လေးများ ဆေး ၁ စီစီကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။ (နို့နှင့် ဖျော်တိုက်ရန်)
ကြက် ဆေး ၃ စီစီရေ ၁၀ လီတာ ၃ ရက်။
ဂက် ဆေး ၈ စီစီရေ ၁၀ လီတာ ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၂၄၀ စီစီ / ၉၆၀ စီစီ







ထိုးဆေးများ





Biocillin-150 LA

ဘိုင်အိုစီလင်-၁၅၀ အယ်လ်အေ
(ပဋိဇီဝထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Amoxicillin base 150 mg.
Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

အမောက်စီစလင် သည် ရောဂါဦးပေါင်းစုံအတွက် ထိရောက်သော ပဋိဇီဝဆေးပါး တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများ ဖြစ်စေသော Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, E.coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus ရောဂါဦးများကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါများကို ကုသနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားတွင်းထိုးရန်။

အထွေထွေသုံး ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက် ထိုးရန်။

- လိုအပ်ပါက ၄၈ နာရီအကြာတွင်ထပ်မံထိုးရန် ။
- နွားကြီးများတွင် တနေရာထဲ ဆေး ၂၀ စီစီ ထက်ပိုမထိုးရ။
- ဝက်တွင်တနေရာ ထဲဆေး ၁၀ စီစီ ထက်ပိုမထိုးရ။
- နွားငယ်၊ သိုးနှင့်ဆိတ်များတွင် တနေရာထဲ ဆေး ၅ စီစီ ထက်ပိုမထိုးရ။
- ဆေးမထိုးမီပုလင်းကိုသေချာစွာလှုပ်ပါ။

ထုပ်ပိုးပုံ

၅၀ စီစီ / ၁၀၀ စီစီ





Butasal-100

ပျူတာဆာလ်-၁၀၀
(အားဖြည့်ထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

- Butafosfan..... 100 mg.
- Vitamin B12, cyanocobalamin 50 μg.
- Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

Butafosfan သည် organic ဖော့စဖာရပ် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အကျိုးပြုသည်။ ဗစ်တာမင်-ဘီ-၁၂ သည် အသားဓါတ်၊ ကစီဓါတ်၊ အဆီဓါတ် ဇီဝပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များကို လှုံ့ဆော်ပေးသည်။

Butasal-100 ကို အောက်ပါအခြေအနေများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။

- ရောဂါကြောင့် ကြီးထွားမှု နှေးခြင်း၊ အစာချေဖျက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ချို့ယွင်းခြင်းများကုသရန်။
- ချိုးမအောင်မှု ပြဿနာများ ကာကွယ်ရန် နှင့် ကုသရန်။
- သားမကျမီ နှင့် သားကျပြီး နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ကာကွယ်ရန် နှင့် ကုသရန်။
- ကယ်လ်စီယမ်နှင့် မဂ္ဂနီစီယမ်ချို့တဲ့မှု ကုသရာတွင် အထောက်အကူအနေဖြင့် ကုသမှုပေးရန်။
- ဒါဏ်ဖိစီးမှု နှင့် အားကုန်ခန်းမှုများကို ကုသရန်။

ဆေးချိန်

အသားဆေး၊ အကြောဆေး၊ အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

- မြင်း၊ နွား ၅ - ၂၅ စီစီ။
- မြင်းငယ်၊ နွားငယ် ၅ - ၁၂ စီစီ။
- သိုး၊ ဆိတ် ၂.၅ - ၅ စီစီ။
- သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ် ၁.၅ - ၂.၅ စီစီ။
- ဂက် ၂.၅ - ၁၀ စီစီ။
- ဂက်ငယ် ၁ - ၂.၅ စီစီ။
- ခွေး၊ ကြောင် ၀.၅ - ၅ စီစီ။
- ကြက် ၁ စီစီ။

ထုပ်ထွင်းပုံ

၁၀၀ စီစီ





Fluconix-340

ဖလူကိုနစ်-၃၄၀

(ကပ်ပါးရောဂါကုထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Nitroxylinl 340 mg.

Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

ဖလူကိုနစ်-၃၄၀သည် နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်တို့တွင်ဖြစ်သောသစ်ရွက်သန်ပြားကောင် Fasciola ကိုအထူးနိုင်နင်း ပါသည်။ ထို့အပြင် နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်တို့တွင်ဖြစ်သော အစာခြေလမ်းကြောင်းသန်ကောင်အချို့၊ Bunostomum, Haemonchus, Oesophagostomum သန်ကောင် ရောဂါများကုသနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

အရေပြားအောက်ကြွက်သားအတွင်းမထိုးမိရန်သတိပြုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Nitroxylinl 10mg ကို ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုနွန်းဖြစ်ပါသည်။

သိုး

အောက်ပါနွန်းအတိုင်းထိုးပါ။

- ကိုယ်အလေးချိန် ၁၄-၂၀ ကီလို ၀.၅၀ စီစီ
- ကိုယ်အလေးချိန် ၂၁-၃၀ ကီလို ၀.၇၅ စီစီ
- ကိုယ်အလေးချိန် ၃၁-၄၀ ကီလို ၁.၀၀ စီစီ
- ကိုယ်အလေးချိန် ၄၁-၅၅ ကီလို ၁.၅၀ စီစီ
- ကိုယ်အလေးချိန် ၅၆-၇၅ ကီလို ၂.၀၀ စီစီ
- ကိုယ်အလေးချိန် ၇၅ ကီလိုအထက် ၂.၅၀ စီစီ

ရောဂါမပျောက်မခြင်းတစ်လခြား တစ်ကြိမ်ထိုးပါ။

နွား

ဆေး ၁.၅ စီစီကို ကိုယ်အလေးချိန် ၅၀ ကီလို နွန်းထိုးရန်။

ရောဂါဖြစ်သောနွားအပြင် ယင်းနွားနှင့်ထိတွေ့သောနွားတိုင်း ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါကတစ်လ တစ်ကြိမ်ထိုးပါ။ ဆေးထိုးထားသောနွားမှန်ကို လူစားသုံးရန်အသုံးမပြုရပါ။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Genta 100
 ဂျင်တာ ၁၀၀
 (ပဋိဇီဝထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Gentamycin base 100 mg.

Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း နှင့် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းတွင် ဖြစ်ပွားသော E.coli, Klebsiella, Pasteurella, Salmonella ရောဂါပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားတွင်းထိုးရန်။

တိရစ္ဆာန်ကြီးများ ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ - ၄၀ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ၃ ရက်။

တိရစ္ဆာန်ငယ်များ ဆေး ၀.၂၅ - ၀.၅၀ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ၃ ရက်။

ထုတ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Glucortin-20

ဂလူကော်တင်-၂၀
(ထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Dexamethasone base 2 mg.

Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

ကျွဲ၊ နွား၊ ဂက်၊ ဆိတ်၊ ခွေးနှင့် ကြောင်များတွင် ဖြစ်ပွားသောထိခိုက်မိ၍ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဓါတ်မတည့် ဖြစ်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နို့စားနွားမများတွင် နို့ပေးကာလ အစတွင် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်အ တွက်အဆီချေဖျက်မှုများခြင်း နှင့် နို့ ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဂလူးကိုစ့် လိုအပ်ချက်များခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ် သော Primary Ketosis ဖြစ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း၊ အဆစ်အမှေးပါးရောင်ခြင်း၊ သွေးလန့်ခြင်း၊ အရွတ်ရောင် ခြင်းတို့အတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားတွင်း (သို့မဟုတ်) သွေးကြောတွင်းထိုးရန်။

ကျွဲ၊ နွား	ဆေး ၅ - ၁၅ စီစီ
နွားငယ်၊ ဆိတ်၊ သိုး၊ ဂက်	ဆေး ၁ - ၂.၅ စီစီ
ခွေး	ဆေး ၀.၂၅-၁ စီစီ
ကြောင်	ဆေး ၀.၂၅ စီစီ

ထုပ်ပိုးပုံ

၅၀ စီစီ





Interflox-100
အင်တာဖလောက်စ်-၁၀၀
 (ပဋိဇီဝထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်
 Enrofloxacin 100 mg.
 Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

အင်တာဖလောက်စ်-၁၀၀ကို Campylobacter, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Salmonella ဘက်တီးရီးယား ရောဂါပိုး များကြောင့်ဖြစ်သော အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ရောဂါများအတွက် သုံးနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ကြက်သားတွင်း သို့မဟုတ် အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

နွား၊ နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ် ဆေး ၁ စီစီကို ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ - ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
 ဝက် ဆေး ၁ စီစီကို ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ - ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Intermectin

အင်တာမက်တင်

(ကပ်ပါးရောဂါကုထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Ivermectin 10 mg.

Excipients ad..... 1 ml.

ဆေးညွှန်း

တိရစ္ဆာန်များတွင်ဖြစ်သော အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းသန်ကောင်၊ အဆုတ်သန်ကောင်စွဲကပ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားသောသန်းစွဲခြင်း နှင့် ဝဲစွဲခြင်း တို့ကိုကုသနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်

ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၅၀ ကီလို။

ဂက်

ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၃၃ ကီလို။

ထုပ်ပိုးပုံ

၅၀ စီစီ





Intertrim

အင်တာထရင်
(ပဋိဇီဝထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Sulfamethoxazole	200 mg.
Trimethoprim	40 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွင် ဖြစ်ပွားသော E.coli, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus ရောဂါပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားတွင်းထိုးရန်။

အထွေထွေသုံး ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ - ၂၀ ကီလို တစ်ရက် ၂ ကြိမ် ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Intrafer-100-B12

အင်ထရာဖာ - ၁၀၀ ဘီ ၁၂

(အားဖြည့်ထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Iron (as iron dextran) 100 mg.

Vitamin B₁₂, cyanocobalamin 100 µg.

Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

တိရစ္ဆာန်ငယ်များတွင်ဖြစ်ပွားသော သွေးအားနည်းရောဂါများအတွက် သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးရန်

ကြွက်သားအတွင်း(သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

နွားငယ် ဆေး ၄ - ၈ စီစီကို မွေးပြီး ၁ ပတ်ခန့်အကြာတွင် အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

ဝက်ငယ် ဆေး ၂ စီစီကို မွေးပြီး ၃ ရက်ခန့်အကြာတွင် ကြွက်သားအတွင်းထိုးရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Introvit

အင်ထရိုဗစ်
(အားဖြည့်ထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin A, retinol-palmitate.....	15 000 IU.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol	7 500 IU.
Vitamin E, α-tocopherol acetate	20 mg.
Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride	10 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavine sodium phosphate	5 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	3 mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin	60 µg.
D-panthenol.....	25 mg.
Nicotinamide.....	50 mg.
Folic acid	150 µg.
Biotin.....	125 µg.
Choline chloride.....	12.5 mg.
Amino acids.....	12 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

ဗစ်တာမင်နှင့် အမီနိုအက်စစ်များ ပေါင်းစပ်ထားသော ထိုးဆေးဖြစ်သည်။

- ဗစ်တာမင်နှင့် အမီနိုအက်စစ် ချို့တဲ့မှုများကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်။
- စိတ်ဖိစီးမှုများ ကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်။
- ကြီးထွားနှုန်းကောင်းရန်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားအတွင်း(သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

ခွား	ဆေး ၁၀ - ၁၅ စီစီ။
သိုး၊ ဆိတ်	ဆေး ၅ - ၁၀ စီစီ။
ဂက်	ဆေး ၂ - ၁၀ စီစီ။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Introvit-B-Complex

အင်ထရိုဗစ်-ဘီ-ကွန်ပလက်စ်
(အားဖြည့်ထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride	10 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavine sodium phosphate	5 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	5 mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin	20 μg.
D-panthenol	12.5 mg.
Nicotinamide	50 mg.
Biotin	100 μg.
Choline chloride	10 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

- ဗစ်တာမင်-ဘီ ချို့တဲ့မှုမှကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်။
- စိတ်ဖိစီးမှုများ ကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်။
- ကြီးထွားမှုနှုန်းကောင်းရန်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားအတွင်း(သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

နွား၊ မြင်း	ဆေး ၁၀ - ၁၅ စီစီ။
နွားငယ်၊ မြင်းငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်	ဆေး ၅ - ၁၀ စီစီ။
သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ်	ဆေး ၅ - ၈ စီစီ။
ဂက်	ဆေး ၂ - ၁၀ စီစီ။

ထုပ်ပိုးပုံ
၁၀၀ စီစီ





Introvit-E-Selen
အင်ထရိုဗစ်-အီး-စီလင်
(အားဖြည့်ထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin E, α tocopherol acetate.....	50.0 mg.
Sodium selenite.....	0.5 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

ဗစ်တာမင်-အီးချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသော ရောဂါများကုသနိုင်ပါသည်။
 ဝက်ငယ်များ သံခါတ်ပါသောထိုးဆေး မပေးမီ သံဆိပ်သင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ထိုးနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားအတွင်း(သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

နွားငယ်၊ သိုးငယ်၊ ဆိတ်ငယ် ဆေး ၂ စီစီကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို
 ၂ - ၃ ပတ်ကြာတစ်ကြိမ်ပြန်ထိုးရန်။

ဝက် ဆေး ၁ စီစီကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို
 ၂ - ၃ပတ်ကြာတစ်ကြိမ်ပြန်ထိုးရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Ketosol-100

ကီတိုဆောလ်-၁၀၀

(ထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Ketoprofen 100 mg.
Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

မြင်းများတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော အရိုး၊အဆစ်နှင့်ကြွက်သား ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်း နှင့် ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွဲ၊နွားများတွင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ နို့အုံရောင်ရမ်းခြင်း တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဝက်မများကလေးမွေးဖွားပြီးစ (၁၆ နာရီ မှ ၃ ရက်) တွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော နို့အုံရောင်ရမ်းခြင်း၊ သားအိမ်ရောင်ခြင်း၊ နို့ထွက်လျော့ခြင်း/ နို့လုံးဝမထွက်ခြင်း ရောဂါလက္ခဏာစု MMA syndrome နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။

ဆေးချိန်

- မြင်း: ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၅ ကီလို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၃-၅ ရက် သွေးကြောအတွင်းထိုးရန်။
- ကျွဲ၊နွား: ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၃၃ ကီလို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ၃ ရက် သွေးကြောအတွင်းထိုးရန် (သို့မဟုတ်) ကြွက်သားအတွင်းထိုးရန်။
- ဝက်: ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၃၃ ကီလို တစ်ကြိမ် ကြွက်သားအတွင်းထိုးရန်။

ထုတ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Limoxin-50
လင်မောက်စင် - ၅၀
 (ပဋိဇီဝထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Oxytetracycline base50 mg.
 Excipients ad1 ml.

ဆေးညွှန်း

အဆစ်ယောင်ခြင်းနှင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ဖြစ်စေသော Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E.coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus ရောဂါပိုးများကိုနှိမ်နင်းနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ကြက်သားအတွင်း (သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

အရွယ်ရောက်ပြီးတိရစ္ဆာန်များ

ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၅ - ၁၀ ကီလိုဂရမ် - ၅ ရက်။

အရွယ်မရောက်သေးသောတိရစ္ဆာန်များ

ဆေး ၂ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၅ - ၁၀ ကီလိုဂရမ် - ၅ ရက်။

သတိပြုရန်

၀က်တွင် တစ်နေရာဆေး ၁၀ စီစီ ထက်ပိုမထိုးရ။

နွားငယ်၊ သိုးနှင့် ဆိတ်တို့တွင် တစ်နေရာဆေး ၅ စီစီ ထက်ပိုမထိုးရ။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Limoxin-200 LA

လင်မောက်စင်-၂၀၀ အယ်လ်အေ
(ပဋိဇီဝထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Oxytetracycline base 200 mg.

Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

အဆစ်ယောင်ခြင်းနှင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ဖြစ်စေသော Bordetella, Campylobacter, Champylobacter, Chlamydia, E.coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus ရောဂါပိုးများကိုနှိမ်နင်းနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားအတွင်း(သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

အထွေထွေသုံး

ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို။

လိုအပ်ပါက ၄၈နာရီအကြာတွင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးပါ။

သတိပြုရန်

နွား တွင် တစ်နေရာဆေး ၂၀ စီစီထက်ပိုမထိုးရ။

ဂက်တွင် တစ်နေရာဆေး ၁၀ စီစီထက်ပိုမထိုးရ။

နွားငယ်၊ သိုးနှင့် ဆိတ်တို့တွင် တစ်နေရာဆေး ၅ စီစီထက်ပိုမထိုးရ။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Macrolan-200

မက်ခရိုလင်-၂၀၀
(ပဋိဇီဝထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Tylosin base	200 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

မက်ခရိုလင်-၂၀၀ကို ဂရမ်(+) ဘက်တီးရီးယားများ Campylobacter, Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus, Treponema ကြောင့်ဖြစ်သော အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း နှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ များကုသရာတွင် သုံးနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားအတွင်းထိုးရန်။

အထွေထွေသုံး ဆေး ၁ စီစီကို ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ - ၂၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Penstrep-400

၁၀၀၀၀ရက်-၄၀၀
(ပဋိဇီဝထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Procaine penicillin G 200 000 IU.

Dihydrostreptomycin sulphate 200 mg.

Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

အဆစ်ယောင်ခြင်း၊ နို့အုံယောင်ခြင်းနှင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများကို ဖြစ်စေသောရောဂါပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်သည်။

Procaine penicillin G သည် Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, Erysipelothrix, Haemophilus, Listeria, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus ရောဂါပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်သည်။

Dihydrostreptomycin သည် E.coli, Klebsiella, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus ရောဂါပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်သည်။

ဆေးချိန်

ကြက်သားတွင်းထိုးရန်။

ခွား၊ မြင်း

ဆေး ၁ စီစီကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၃ ရက်။

ခွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်

ဆေး ၁ စီစီကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလို ၃ ရက်။

ဆေးမထိုးမီပုလင်းကိုသေချာစွာလှုပ်ပါ။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Procaben LA

ပရိုကာဗင်-အယ်လ်အေ
(ပဋိဇီဝထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Procaine penicillin G.....	150 000 IU.
Benzathine penicillin G.....	150 000 IU.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

အဆစ်ယောင်ခြင်း၊ နို့အုံယောင်ခြင်း နှင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများကိုဖြစ်စေသော Campylobacter, Clostridium, Corynebacterium, Erysipelothrix, Haemophilus, Listeria, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus ရောဂါပိုးများကို နှိမ်နင်းနိုင်သည်။

ဆေးကိုကြွက်သားအတွင်းထိုးပြီးပါက ၁ နာရီ မှ ၂ နာရီတွင် သွေးလှည့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရောဂါပိုးကို နှိမ်နင်းနိုင်သော ဆေးပမာဏ ရောက်ရှိပါသည်။

Benzathine penicillin G ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ တဖြည်းဖြည်းခြင်းသာစုပ်ယူသဖြင့် ဆေးအာနိသင်ကို ၂ ရက်မျှကြာအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားတွင်းထိုးရန်။

နွား	ဆေး ၁ စီစီကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလိုမီ။
နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်	ဆေး ၁ စီစီကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုမီ။

လိုအပ်ပါက ၄၈နာရီအကြာတွင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးပါ။
ဆေးမထိုးမီပုလင်းကိုသေချာစွာလှုပ်ပါ။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Vitol-140

ဗစ်တော-၁၄၀
(အားဖြည့်ထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin A, retinol palmitate	80 000 IU.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol	40 000 IU.
Vitamin E, α tocopherol acetate	20 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

- ဗစ်တာမင်-အေ၊ ဗစ်တာမင်-ဘီ၊ ဗစ်တာမင်-အီး ချို့တဲ့မှုမှကာကွယ်ရန် နှင့် ကုသရန်။
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ရောဂါကျရောက်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ စိုထိုင်းဆများခြင်း၊ အပူချိန်အပြောင်းအလဲများခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော ဖိစီးမှုများ သက်သာရန် နှင့် ကုသရန်။
- ထုတ်လုပ်မှုကောင်းရန်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားအတွင်း (သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။

နွား၊ မြင်း	ဆေး ၁၀ စီစီ။
နွားငယ်၊ မြင်းငယ်	ဆေး ၅ စီစီ။
သိုး၊ ဆိတ်	ဆေး ၃ စီစီ။
ဂက်	ဆေး ၅ - ၈ စီစီ။
ဂက်ငယ်	ဆေး ၁ - ၃ စီစီ။
ခွေး	ဆေး ၁ - ၅ စီစီ။
ကြောင်	ဆေး ၁ - ၂ စီစီ။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ စီစီ





Xyla
နိုင်းလာ
 (စိတ်ငြိမ်ထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်
 Xylazine base 20 mg.
 Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ သားမွေးခြင်း နှင့် အသေးစားခွဲစိတ်ကုသမှုများတွင်စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အိပ်ဆေးအနေဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ အကြီးစား ခွဲစိတ်မှုများအတွက် မေ့ဆေးမပေးမီ အကြိုမေ့ဆေးအနေနှင့် သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

- နွား - ကြွက်သားတွင်း(သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။
 စိတ်ငြိမ်ရန်နှင့် အသေးစားခွဲစိတ်မှုများ ဆေး ၀.၂၅ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို။
 တိရစ္ဆာန်ရပ်လျက်အသေးစားခွဲစိတ်မှုများ ဆေး ၀.၅ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို။
 တိရစ္ဆာန်လဲလျောင်းလျက်အကြီးစားခွဲစိတ်မှုများ ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို။
 အတွင်းပိုင်းခွဲစိတ်မှုအကြီးစားများ ဆေး ၁.၅ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို။

*ဆေးမပေးမီနာရီအတန်ကြာအစာဖြတ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

- မြင်း - ကြွက်သားတွင်း (သို့မဟုတ်) သွေးကြောအတွင်းသွင်းရန်။
 ဆေး ၄ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို။
 ဆေး ၁၀ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလို။
 အကြီးစားခွဲစိတ်မှုများအတွက် ဖလူအိုသိန်း (သို့မဟုတ်) ဟေလိုသိန်း မေ့ဆေးများနှင့် တွဲဖက်ပြီး ဆေး ၄ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် ကိုသွေးကြောအတွင်းသွင်းရန်။
- ဆိတ် ဆေး ၀.၁၅ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ် ကြွက်သားအတွင်းထိုးရန်။
- ခွေး ဆေး ၀.၁၅ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလိုဂရမ် ကြွက်သားတွင်း (သို့မဟုတ်) သွေးကြောအတွင်း သွင်းရန်။
 ဆေး ၀.၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလိုဂရမ်ကို ကတ်တမင်း ၆-၁၀ မီလီဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလိုဂရမ်နှုန်း တွဲသုံးရန်။
- ကြောင် ဆေး ၀.၁၅ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလိုဂရမ် ကြွက်သားတွင်း (သို့မဟုတ်) အရေပြားအောက်ထိုးရန်။
 ဆေး ၀.၁ စီစီ / ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလိုဂရမ် ကို ကတ်တမင်း ၆ - ၁၀ မီလီဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၁ ကီလိုဂရမ်နှုန်း တွဲသုံးရန်။

ထုတ်ဖိုးပုံ
 ၅၀ စီစီ







ရေဖျော်အားဆေးပျက်များ





Introvit A+ WS

အင်ထရိုဗစ်-အေ+
(ရေဖျော်အားဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

Vitamin A, retinol-acetate	20 000	I.U.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol	6 000	I.U.
Vitamin E, α-tocopherol acetate.....	.60	mg.
Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride6	mg.
Vitamin B ₂ , riboflavin12	mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride8	mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin.....	.60	μg.
Vitamin C, ascorbic acid.....	.40	mg.
Ca -pantothenate.....	.20	mg.
Vitamin K ₃ ,4	mg.
Nicotinamide80	mg.
Folic acid2	mg.
Biotin300	μg.
Choline chloride.....	.5	mg.
Iron sulphate12	mg.
Magnesium sulphate12	mg.
Manganese sulphate12	mg.
Zinc sulphate12	mg.
Sodium chloride100	mg.
Potassium chloride.....	.25	mg.
Alanine2.24	mg.
Arginine1.24	mg.
Aspartic acid5.10	mg.
Cysteine1.14	mg.
Glutamic acid.....	.8.80	mg.
Glycine.....	.21.02	mg.
Histidine1.12	mg.
Iso-Leucine2.98	mg.
Leucine4.74	mg.
Lysine.....	.54.24	mg.
Methionine50.82	mg.
Phenyl alanine1.32	mg.
Proline2.68	mg.
Serine2.72	mg.
Threonine3.36	mg.
Tryptophane.....	.0.84	mg.
Tyrosine.....	.1.06	mg.
Valine.....	.2.84	mg.
Exipients ad1	g.

ဆေးညှန်း

အင်ထရိုဗစ်ရေဖျော်ဆေးသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော ဗစ်တာမင်သက်စောင့်ဓါတ်များ၊ အမီနိုအက်စစ်များ ပါဝင်သည်။ တိရစ္ဆာန်များ လိုအပ်သော ဗစ်တာမင် နှင့် အမီနိုအက်စစ်များကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ချိန်ညှိထည့်ထား ပါသည်။ အင်ထရိုဗစ်ရေဖျော်ဆေး ကိုအောက်ပါတို့ အတွက်သုံးနိုင်ပါသည်။

- ဖွေးမြူရေးတီရစ္ဆာန်များတွင် ဗစ်တာမင် နှင့် အမီနိုအက်စစ် ချို့ တွဲမှုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်။
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆမြင့်ခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်သော ဒါဏ်ပိမှုများ သက်သာလျော့နည်းရန်။
- အစာအကျုံးဖြစ်ထွန်းမှု FCR (အစာမှ အသား၊ နို့၊ ဥ ပြောင်းလဲနှုန်း အချိုး) ကောင်းမွန်ရန်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြွက်၊ ဝက်
နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်
နွားကြီး

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၄ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။
ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၈၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးမှု

၁၀၀၀ ဂရမ်





Introvit-ES-200 WS
အင်ထရိုဗစ်-အီးအက်စ်-၂၀၀
 (ရေဖျော်အားဆေးမှုန့်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်
 Vitamin E, α-tocopherol acetate 200 mg.
 Sodium selenite..... 2 mg.
 Exipients ad 1 g.

ဆေးညွှန်း

အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ ဥနှုန်းကျခြင်း၊ မျိုးအောင်နှုန်း ကျခြင်း တို့တွင် သုံးနိုင်သည်။
 ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကြက်၊ ဝက်

ကြက်ငယ် (အသက် ၂၁ ရက်အောက်)

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်

နွားကြီး

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၈ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၂ - ၄ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၈၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၁၆၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ ဂရမ်





Stressmix WS

ဝေဝေရက်မစ်

(ရေဖျော်အားဆေးမှုန့်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ ဂရမ်တွင်

Vitamin A, retinol acetate	15,000 IU.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol	4500 IU.
Vitamin E, α-tocopherol acetate	1.35 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavin	4.5 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	2.35 mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin	11.5 µg.
Vitamin C, ascorbic acid	1.0 mg.
Vitamin K ₃	4.5 mg.
Ca-panthothenate	5.4 mg.
Nicotinamide	16.7 mg.
Copper sulphate	12 mg.
Magnesium sulphate	12 mg.
Manganese sulphate	12 mg.
Zinc sulphate	12 mg.
Sodium chloride	50 mg.
Potassium chloride	88 mg.
Glycine	20 mg.
Lysine	15 mg.
Methionine	10 mg.
Exipients ad	1 g.

ဆေးညွှန်း

ဝေဝေရက်မစ်ရေဖျော်အားဆေးတွင် ဗစ်တာမင်များ၊ သတ္တုဓါတ်များ၊ အမိန့်အက်စစ်များကို ဒါဏ်ဖိစီးမှုများ သောအချိန်များတွင်အသုံးပြုရန် ပုံစံထုတ် ဖော်စပ်ထားပါသည်။
 ဝေဝေရက်မစ်ရေဖျော်ဆေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆများခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများခြင်း စသော ဖိစီးမှုများမှ ကာကွယ်ရန်နှင့်သက်သာပျောက် ကင်းရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

- နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ် ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
- နွားကြီး ဆေး ၁ ဂရမ် ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
- ကြက်၊ ဝက် ဆေး ၁ ဂရမ် ရေ ၂ လီတာနှုန်း ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀ ဂရမ် / ၁၀၀၀ ဂရမ်





ရေဖျော်အားဆေးရည်များ





Aminogrow Oral

အမိန့်ဂရိုး

(ရေဖျော်အားဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Alanine	9.6 mg.
Arginine	12 mg.
Aspartic acid	25.2 mg.
Cysteine	0.4 mg.
Glutamic acid	39.6 mg.
Glycine	8.4 mg.
Histidine	4.8 mg.
Iso-leucine	6 mg.
Leucine	13.2 mg.
Lysine	10.8 mg.
Methionine	2.4 mg.
Phenyl alanine	8.4 mg.
Proline	10.8 mg.
Serine	9.6 mg.
Threonine	6 mg.
Tryptophane	0.5 mg.
Tyrosine	4.8 mg.
Valine	6 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

အမိန့်အက်စစ်များသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဇီဝရုပ်ဖြစ်စဉ်များ၊ လုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ အမိန့်ဂရိုး ရေဖျော်အားဆေးရည်ကို အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

- မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များတွင် အမိန့်အက်စစ်ချို့တဲ့မှုမှ ကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်။
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆမြင့်ခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သော ဒါဏ်ပိမှုများ သက်သာ လျော့နည်းရန်။
- အစာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု FCR (အစာမှ အသား၊ နို့၊ ဥ ပြောင်းလဲနှုန်း အချိုး) ကောင်းမွန်ရန်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ် ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

နွားကြီး ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၈၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

ကြက်၊ ဝက် ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၄ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Betasol-C Oral

ဘီတာဆောလ်-စီ
(ရေဖျော်အားဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Betaine	250 mg.
Vitamin C, ascorbic acid	90 mg.
Potassium chloride	2 mg.
Magnesium chloride hexahydrate	4 mg.
Calcium chloride dihydrate	40 mg.
Sodium chloride	20 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

- အပူချိန်အပြောင်းအလဲများခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော စိတ်ဖိစီးမှုများသက်သာစေရန်။
- ခရီးပန်းခြင်းနှင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန်၊ ကုသရန်။
- ဥတိုးနှုန်းကြီးထွားနှုန်းနှင့်အသားတိုးနှုန်းကောင်းမွန်ရန်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ကာကွယ်ခြင်း ပူပြင်းသောကာလမတိုင်မီ(သို့) အပူချိန်မမြင့်မီ ၂ ရက်ကြိုတင်၍ တိုက်ပေးရန်။
ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၁ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထိန်းချုပ်ခြင်း ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၀.၅ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Calcimin Oral

ကယ်စီမင်

(ရေဖျော်အားဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Calcium	34.0 mg
Vitamin D ₃	2,000 IU
Magnesium	2.5 mg
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

ကယ်စီမင်ဆေးရည်သည် အရိုးကို ခိုင်မာစေပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ သွေးအတွင်းရှိ ကယ်စီယမ် နှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ် ပါဝင်မှုကိုလည်း ထိန်းညှိပေးသည့်အပြင် ဥနှုန်းတိုးစေပြီး ဥခွံမာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

သတိပြုရန်

ကယ်စီမင်ကို အခြားသော ကုသဆေးများ နှင့် တပြိုင်တဲ ရေဖျော်တိုက်ခြင်း မပြုရ။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ဥစားကြက်မ

ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၁ လီတာ ၃ - ၇ ရက်တိုက်ခြင်းဖြင့် ဥခွံပျော့ခြင်းကိုသက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ဥခွံပျော့ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် ၁ ပတ် ၁ ကြိမ်တိုက်ကျွေးပါ။

အသားတိုးကြက်

ဆေး ၁ - ၂ စီစီ ရေ ၁ လီတာ
အရိုးပျော့ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် ၁ ပတ် ၁ ကြိမ်တိုက်ပါ။

ခွား၊ သိုး

ဆေး ၂.၅ စီစီ ရေ ၁ လီတာ

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀စီစီ





Electrosol Oral

အလက်ထရိုဆောလ်
(ရေဖျော်ဒဏ်ခံအားဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Dextrose	280 mg.
Sodium chloride	110 mg.
Glycine	45 mg.
Sodium dihydrogen phosphate	22 mg.
Potassium chloride	13.5 mg.
Sodium citrate	5 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်း နှင့် ခရီးပန်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သောရေခါတ်ခန်း ခြောက်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပြီး ဆေးတွင်ပါဝင်သော အမိနိုအက်စစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဂလိုင်စင်းကြောင့်လျင်မြန်စွာ နှာလန်ထနိုင်ပါသည်။

ခရီးပန်းခြင်းနှင့် ရေခါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် ကုသရန် သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်
ကြက်

ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၂၀ လီတာ ၁ ရက် ၂ ကြိမ် ၂ - ၄ ရက်။
ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၀.၇၅ - ၁ လီတာ ၂ - ၄ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Intertonic Oral

အင်တာတော့နစ်

(ရေဖျော်အားဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Sorbitol	200 mg.
Carnitine hydrochloride	50 mg.
Betaine hydrochloride	10 mg.
Choline chloride	200 mg.
D-Panthenol	25 mg.
Magnesium sulphate	100 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

တိရစ္ဆာန်များတွင် အဆီများသောအစားအစာများ ကျွေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သောအစာချေမှုဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များကို အင်တာတော့နစ် တိုက်ကျွေး ခြင်းဖြင့် တားဆီးနိုင်သောကြောင့် အစာချေမှုလမ်းကြောင်းကို ကောင်းမွန်စေသည်။ အသဲအဆီဖုံးခြင်း၊ အသဲနှင့်ပတ်သက်သော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပွားခြင်း တို့ကို တားဆီးပေးပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

- နွား၊ မြင်း
- သိုး၊ ဆိတ်၊ နွားငယ်
- ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၃ - ၄ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၅ - ၇ ရက်။

ဆေး ၃ - ၄ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၅ - ၇ ရက်။

ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၂ လီတာ ၅ - ၇ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Introchick Oral

အင်ထရိုချပ်

(ရေဖျော်အားဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ဝ စီစီတွင်	
Vitamin A, retinol palmitate	2 500 IU.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol	500 IU.
Vitamin E, α tocopherol acetate	3.75 mg.
Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride	3.5 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavine sodium phosphate	4.0 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	2.0 mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin	10.0 µg.
Vitamin K ₃	0.25 mg.
D-Panthenol	15.0 mg.
Biotin	2.0 µg.
Choline chloride	400 µg.
Inositol	2.50 mg.
Alanine	0.975 mg.
Arginine	0.49 mg.
Aspartic acid	1.45 mg.
Cysteine	0.15 mg.
Glutamic acid	1.16 mg.
Glycine	0.575 mg.
Histidine	0.90 mg.
Isoleucine	0.125 mg.
Leucine	1.50 mg.
Lysine	2.50 mg.
Methionine	5.0 mg.
Phenylalanine	0.81 mg.
Proline	0.51 mg.
Serine	0.68 mg.
Threonine	0.50 mg.
Tryptophane	75 µg.
Thyrosine	0.34 mg.
Valine	1.10 mg.
Solvent ad	1 ml.

ဆေးညှန်း

အင်ထရိုချပ်ရေဖျော်ဆေးရည်တွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော ဗဟိတမင်သက်စောင့် ဓါတ်များ၊ အမိနီအက်စစ်များ ပါဝင်သည်။ တိရစ္ဆာန်များ လိုအပ်သော ဗဟိတမင်နှင့် အမိနီအက်စစ်များကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီချိန်ညှိထည့်ထားပါသည်။ အင်ထရိုချပ်ရေဖျော်ဆေးကိုအောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။

- မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များတွင် ဗဟိတမင်နှင့် အမိနီအက်စစ် ချို့တဲ့မှုကာကွယ်ရန် နှင့်ကုသရန်။
- ကာကွယ်ဆေးတိုးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆမြင့်ခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု များခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သော ဒါဏ်ပိမှုများ သက်သာ လျော့နည်းရန်။
- အစာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု FCR (အစာမှ အသား၊ နို့၊ ဥ ပြောင်းလဲနှုန်းအချိုး) ကောင်းရန်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်	ဆေး ဝ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၅-၁၀ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
နွားကြီး	ဆေး ဝ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀-၂၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
ကြက်၊ ဝက်	ဆေး ဝ စီစီ ရေ ၀.၅ - ၁ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးမှု

၁၀၀၀ စီစီ





Introvit A+ Oral

အင်ထရိုဗစ်-အေ+ (ရေဖျော်အားဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin A, retinol-palmitate	10 000 IU.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol	3 000 IU.
Vitamin E, α tocopherol acetate	30 mg.
Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride	3 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavine sodium phosphate	6 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	4 mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin	30 µg.
Vitamin C, ascorbic acid	20 mg.
Vitamin K ₃	2 mg.
D-panthenol	10 mg.
Nicotinamide	40 mg.
Biotin	150 µg.
Folic acid	1 mg.
Choline chloride	25 mg.
Alanine	1.44 mg.
Arginine	1.80 mg.
Aspartic acid	3.78 mg.
Cysteine	0.06 mg.
Glutamic acid	5.94 mg.
Glycine	11.26 mg.
Histidine	0.72 mg.
Iso-Leucine	0.90 mg.
Leucine	1.98 mg.
Lysine	11.62 mg.
Methionine	10.36 mg.
Phenylalanine	1.26 mg.
Proline	1.62 mg.
Serine	1.44 mg.
Threonine	0.90 mg.
Tryptophane	0.08 mg.
Tyrosine	0.72 mg.
Valine	0.90 mg.
Excipients ad.....	1 ml.

စေးညှန်း

အင်ထရိုဗစ်-အေ+ရေဖျော်ဆေးရည်တွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော ဗဟိတမင်သက် စောင့်ခါတ်များ၊ အမိန့်အက်စစ်များ ပါဝင်သည်။ တိရစ္ဆာန်များ လိုအပ်သော ဗဟိတမင်နှင့်အမိန့်အက်စစ်များ ကို လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ ချိန်ညှိထည့်ထားပါသည်။

အင်ထရိုဗစ်-အေ+ရေဖျော်ဆေးကို အောက်ပါတို့အတွက် သုံးနိုင် ပါသည်။

- တိရစ္ဆာန်များတွင် ဗဟိတမင်နှင့် အမိန့်အက်စစ် ချို့တဲ့မှု ကာကွယ်ရန် ကုသရန်။
- ကာကွယ်ဆေးတိုးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆ မြင့်ခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သော ဒါဏ်ပိမှုများ သက်သာလျော့နည်းရန်။
- အစာအကျုံးဖြစ်ထွန်းမှု FCR (အစာမှ အသား၊ နို့၊ ဥ ပြောင်းလဲနှုန်းအချိုး) ကောင်းမွန်ရန်။

စေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်	ဆေး ၁စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
နွားကြီး	ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
ကြက်၊ ဝက်	ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၂ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Introvit B-Complex Oral

အင်ထရိုဗစ် - ဘီ - ကွန်ပလက်စ်

(ရေဖျော်အားဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride	6 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavin sodium phosphate	12 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	8 mg.
Vitamin B ₁₂ , cyanocobalamin	60 µg.
Vitamin C, ascorbic acid	40 mg.
Vitamin K ₃ ,	4 mg.
D panthenol	20 mg.
Nicotinamide	80 mg.
Biotin	300 µg.
Folic acid	1 mg.
Chlorine chloride	50 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

အင်ထရိုဗစ်-ဘီ-ကွန်ပလက်စ် တွင် နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ကြက်၊ ဝက်တို့ အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိ မဖြစ်လိုအပ်သော ဗစ်တာမင်-ဘီ အုပ်စုဝင်များ ပါဝင်ပါသည်။

- မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များတွင် ဗစ်တာမင်-ဘီ ချို့တဲ့မှုကိုကာကွယ်ရန် နှင့် ကုသရန် သုံးနိုင်ပါသည်။
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ စိုထိုင်းဆမြင့်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သော ဒဏ်ပိမှုများကို သက်သာလျော့နည်းရန်။
- အစာအကျုံးဖြစ်ထွန်းမှု (Feed Conversion Ratio) ကောင်းရန်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်	ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလိုဂရမ် ၂ - ၅ ရက်
နွားကြီး	ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၈၀ ကီလိုဂရမ် ၂ - ၅ ရက်
ကြက်၊ ဝက်	ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၄ လီတာ ၂ - ၅ ရက်

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Introvit-ES-100 Oral

အင်ထရိုဗစ်-အီးအက်စ်-၁၀၀
(ရေဖျော်အားဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin E, α tocopherol acetate	100 mg.
Sodium selenite	1 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

အာရုံကြောအားနည်းခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ ဥနှုန်းကျခြင်း၊ မျိုးအောင်နှုန်းကျခြင်း တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်

ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

နွားကြီး

ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၈၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။

ကြက်၊ ဝက်

ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၄ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ကြက်ငယ် အသက် (၂၁) ရက်အောက်

ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၁ - ၂ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Nutrisol Oral
နူးထရီဆောလ်
 (ရေဖျော်အားဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Copper	12 mg.
Zinc	21 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

နူးထရီဆောလ် ဆေးရည်တွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော သတ္တုဓါတ်များကို အစာခြေလမ်းကြောင်းမှ အလွယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်ရန် ပြုပြင်ပေးထားပါသည်။ Copper နှင့် Zinc ဓါတ်တို့သည် ခန္ဓာကိုယ်ခုခံစွမ်းအားကိုမြှင့်စေသည်။

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဓိန်အက်စစ်များသည် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားရေးအတွက်လိုအပ် သည်။

အော်ဂဲနစ်အက်စစ်များက အစာအိမ်တွင် ရောဂါပိုးများ မပေါက်ပွားနိုင်ရန် တားဆီးပေးသည်။

နူးထရီဆောကို ဝမ်းပျက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်၊ အပူဒဏ်ပိခြင်းမှသက်သာရန်၊ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်နှင့် အပူဒဏ်ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု မကျစေရန် သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

ဝက်၊ ကြက် ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၁ လီတာ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ၅ - ၇ ရက်တိုက်ရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀စီစီ





Stimosol Oral

စတီမိုဆောလ်
(ရေဖျော်အားဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Yeast extract	60.0 mg.
Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride	3.0 mg.
Vitamin B ₂ , riboflavine	6.0 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	4.0 mg.
Citric acid.	16.0 mg.
Malic acid.	3.0 mg.
Phosphoric acid	13.6 mg.
Tartaric acid	3.0 mg.
Copper sulphate	20.0 mg.
Potassium chloride	0.40 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

စတီမိုဆောလ်ရေဖျော်ဆေးရည်တွင် တဆေးထုတ်နှုတ်ပစ္စည်းများ (Yeast Extract)၊ ဗစ်တာမင်-ဘီများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အက်စစ်များပါဝင်သည်။ စတီမိုဆောလ် ရေဖျော်ဆေးရည်ကို ကြီးထွားမှု လှုံ့ဆော်ရန် (Growth Promoter) အဖြစ်သုံးနိုင်ပါသည်။

စတီမိုဆောလ် ရေဖျော်ဆေးရည်၏ အခြားအသုံးဝင်မှုများမှာ

- ပါဝင်သောအက်စစ်များ၏အစွမ်းကြောင့်ပက်တီးရီးယားများကိုနှိမ်နင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။
- အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်း အတွင်းမလိုလားအပ်သော အကုဇီဝပိုးများ ကပ်ညီမှု၊ အကုဇီဝပိုးများကြောင့် အာဟာရများ ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်တားဆီးပေးသည်။
- အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအတွင်း လိုလားအပ်သော အကုဇီဝပိုးများ ပွားများရန်အတွက် လိုအပ်သောအာဟာရများ၊ ဗစ်တာမင် နှင့် ကြီးထွားမှုဓါတ်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- အင်ဇိုင်းများ ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထုတ်လုပ်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
- ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မလိုလားအပ်သော အဆိပ်အတောက်များ ရေဖျက်ခြင်းဖယ်ရှားခြင်း ပြုလုပ်ပေးသည်။
- ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါခုခံစနစ် (Immune system) ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

အထွေထွေသုံးအနေဖြင့်ဆေး ၁ စီစီကိုရေ ၂ - ၄ လီတာနှုန်း ၃ - ၅ ရက် တိုက်ရန်။

မသုံးမီဆေးဘူးကိုသေအောင်သေချာစွာလှုပ်ပါ။

ထုတ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Stressol Oral

စထရက်ဆောလ်
(ရေဖျော်အားဆေးရည်)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin A, retinol palmitate	12 000 IU.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol	3 000 IU.
Vitamin E, α tocopherol acetate	3.25 mg.
Vitamin B ₁ , thiamine hydrochloride	2.0 mg.
Vitamin B ₆ , pyridoxine hydrochloride	1.25 mg.
Vitamin C, ascorbic acid	3.50 mg.
Vitamin K ₃	1.0 mg.
D-panthenol	4.0 mg.
Folic acid	0.25 mg.
Alanine	1 mg.
Arginine	0.5 mg.
Aspartic acid	0.55 mg.
Cysteine	10 µg.
Glutamic acid	1.1 mg.
Glycine	2.70 mg.
Histidine	80 µg.
Isoleucine	90 µg.
Leucine	0.32 mg.
Lysine	0.45 mg.
Methionine	80 µg.
Phenylalanine	0.20 mg.
Proline	1.65 mg.
Serine	0.10 mg.
Threonine	90 µg.
Thyrosine	60 µg.
Tryptophane	20 µg.
Valine	0.26 mg.
Calcium	60 µg.
Sodium	60 µg.
Iron	0.275 µg.
Copper	0.033 µg.
Potassium	0.85 µg.
Zinc	0.10 µg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

စထရက်ဆောလ်ရေဖျော်ဆေးရည်တွင် ဗစ်တာမင်များ၊ သတ္တုဓါတ်များ၊ အမိနီအက်စစ်များ ကို ဒါဏ်ဖိစီးမှုများသော အချိန်များတွင် အသုံးပြုရန် ပုံစံထုတ်ဖော်စပ် ထားပါသည်။ စထရက်ဆောလ် ရေဖျော်ဆေးရည်ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ စိုထိုင်းဆများခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများခြင်း စသော ဖိစီးမှုများမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် သက်သာပျောက်ကင်း ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

- နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ် ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
- နွားကြီး ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
- ကြက်၊ ဝက် ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၂ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Vitol-86 Oral

ဗစ်တာ - ၈၆

(ရေဖျော်အားဆေးရည်)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Vitamin A, retinol-palmitate	20 000 IU.
Vitamin D ₃ , cholecalciferol	6 000 IU.
Vitamin E, α tocopherol acetate	60 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

- ဗစ်တာမင်-အေ၊ ဗစ်တာမင်-ဒီ၊ ဗစ်တာမင်-အီး၊ ချို့တဲ့မှုမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုသရန်။
- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊ ရောဂါကျရောက်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ စိုထိုင်းဆများခြင်း၊
- အပူချိန်အပြောင်းအလဲ များခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဖိစီးမှုများ သက်သာရန်နှင့် ကုသရန်။
- ထုတ်လုပ်မှုကောင်းရန်။

ဆေးချိန်

ရေဖျော်တိုက်ရန်။

နွားငယ်၊ သိုး၊ ဆိတ်	ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
နွားကြီး	ဆေး ၁ စီစီ ကိုယ်အလေးချိန် ၈၀ ကီလို ၃ - ၅ ရက်။
ကြက်၊ ဝက်	ဆေး ၁ စီစီ ရေ ၄ လီတာ ၃ - ၅ ရက်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





အထွေထွေသုံးစားများ





Biomycin-M

ဘိုင်အိုဆိုင်စင်-အမ်
(နို့အုံရောင်ကုထိုးဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Amoxycillin trihydrate	100 mg.
Neomycin sulphate	50 mg.
Excipients ad	1 ml.

ဆေးညွှန်း

Amoxycillin နှင့် Neomycin ပေါင်းစပ်ထားသောဆေးဖြစ်သည်။
Amoxycillin သည် broad spectrum penicillin ဖြစ်၍ ဂရမ် (+) နှင့် ဂရမ် (-) ဘက်တီးရီးယားများကို နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။
Neomycin နှင့် Amoxycillin ကို sensitive ဖြစ်သော micro-organism များ Corynebacterium, E.coli, Staphylococcus, Streptococcus ကြောင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော နို့အုံရောင်ခြင်းကို ကုသနိုင်သော ဆေးဖြစ်ပါသည်။

ဆေးညွှန်း

နို့တံအတွင်းထိုးရန်။
၁ ရက် Injector ၁ ချောင်း အများဆုံး ၃ ရက်။
Injector မထိုးသွင်းမီ နို့ကုန်အောင်ညှစ်ထားပြီး နို့တံကို သေချာစွာ ဆေးကြောပိုး သတ်ထားရပါမည်။

ထုပ်ပိုးပုံ
၅ စီစီ





Tryponil

ထရပ်နိုင်း

(ကပ်ပါးရောဂါကုထိုးဆေး)



ပါဝင်မှု

ဆေး ၂.၃၆ ဂရမ်တွင်

Diminazene aceturate 1.05 g.

ဆေးညွှန်း

နွား၊ မြင်း၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ခွေး နှင့် ကြောင်တို့တွင်ဖြစ်သော Babesia, Piroplasmosis, Tripanosomiasis ကပ်ပါးရောဂါကာကွယ်ရန် နှင့် ကုသရန်သုံးနိုင်ပါသည်။

ဆေးချိန်

ကြွက်သားတွင်းထိုးရန်။

သာမန်သုံးအတွက် ၂.၃၆ ဂရမ်ပါသောဆေးထုပ်ကို မိုးရေ ၁၅ စီစီတွင်ဖျော်စပ်ပြီး ဆေး ၁ စီစီကို ကိုယ်အလေးချိန် ၂၀ ကီလိုနွန်းသုံးရန်။

၂.၃၆ ဂရမ်ပါသောဆေးထုပ် သည် ကိုယ်အလေးချိန် ၃၀၀ ကီလို အတွက်သုံးနိုင်ပါသည်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၂.၃၆ ဂရမ်





Limoxin-25 Spray

လင်မောက်စင်-၂၅
(အနာဖျန်းဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Oxytetracycline hydrochloride 25 mg.
Excipients ad 1 ml.

ဆေးညွှန်း

တိရစ္ဆာန်များတွင် ဒါဏ်ရာအနာတရဖြစ်ပါက ဒါဏ်ရာပေါ်ဖျန်းပေးရန်။
မျက်လုံးများအတွင်းမဝင်ရန်သတိပြုပါ။

ဆေးချိန်

ဒါဏ်ရာပေါ်သို့ ၆ - ၈ လက်မခန့်အကွာမှ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ဖျန်းပေးရန်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၂၀၀ စီစီ





ခြံသုံးပိုးသတ်ဆေးများ



Dexid-400

ဒက်စစ်-၄၀၀

(ခြံသုံးပိုးသတ်ဆေး)

ပါဝင်မှု

ဆေး ၁ စီစီတွင်

Quaternary ammonium compounds	250 mg.
Glutaraldehyde	100 mg.
Isopropanol	130 mg.
Pine oil	3 mg.
Excipients ad	1 ml.

ခွေးညွှန်း

ဒက်စစ်-၄၀၀ ခြံဖျန်းပိုးသတ်ဆေး နှင့် အခြားသောပိုးသတ်ဆေးများနှင့် မတူသောထူးခြားချက်မှာ QAC နှင့် Glutaraldehyde ပေါင်းစပ်ထားပြီး ပါဝင်နှုန်းမှာလည်း အခြားပိုးသတ်ဆေးများထက် ၂ ဆမြင့်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စုနှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့် ပေါင်းစပ်ထောက်ကူမှုအာနိသင်ကြောင့် ရောဂါပိုးများသတ်နိုင်မှုစွမ်းအားပိုမိုမြင့်မားလာပါသည်။

ဒက်စစ်-၄၀၀သည် တိရစ္ဆာန်များတွင် ကျရောက်ဖြစ်ပွားသော အရေကြီးရောဂါများဖြစ်စေသည့် ပိုင်းရစ်စ်ပိုး၊ ဗက်တီးရီးယားပိုး၊ ဗိုက်ကိုပလတ်စမာနှင့် မှိုများကို ထိရောက်စွာသတ်နိုင်ပါသည်။ ဒက်စစ်-၄၀၀ကို ရေပူရေအေး ၂ မျိုးလုံးနှင့်ရောစပ်သုံးနိုင်ပြီး အညစ်အကြေးများရှိနေစဉ်ပင် ကောင်းစွာထိုးဖောက်ပိုးသတ်နိုင်ပြီး ရေစေး (Hard water) ကြောင့်လည်းအာနိသင် ဖျက်ပြယ်သွားခြင်းမရှိပါ။ သုံးပြီးပါက အလွယ်တကူခါတ်ပြိုကွဲသွားသဖြင့် ပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်းကာကွယ်ပါသည်။

ဒက်စစ်-၄၀၀ကို မွေးမြူရေးအဆောက်အဦများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ပိုးသတ်ရန်သုံးနိုင်ပါသည်။ မွေးမြူရေးခြံရှိ ယာဉ်အဝင်အထွက်ပိုးသတ်ကန်နှင့် ခြံစီးဖိနပ်များပိုးသတ်ရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။

ဆေးချိန်

- ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမရှိချိန် ဒက်စစ်-၄၀၀ ၁ လီတာ ရေ ၄၀၀ လီတာ
- ရောဂါဖြစ်ပွားချိန် ဒက်စစ်-၄၀၀ ၁ လီတာ ရေ ၂၀၀ လီတာ
- တိရစ္ဆာန်သယ်ယာဉ်များ ဒက်စစ်-၄၀၀ ၁ လီတာ ရေ ၂၀၀ လီတာ
- အစာသယ်ယာဉ်များ ဒက်စစ်-၄၀၀ ၁ လီတာ ရေ ၂၀၀ - ၄၀၀ လီတာ
- အစာသိုလှောင်ခန်းများ ဒက်စစ်-၄၀၀ ၁ လီတာ ရေ ၂၀၀ - ၄၀၀ လီတာ
- ယာဉ်နှင့်ဖိနပ်ပိုးသတ်ကန်များ ဒက်စစ်-၄၀၀ ၁ လီတာ ရေ ၂၀၀ လီတာ
- ယာဉ်နှင့်ဖိနပ်ပိုးသတ်ကန်များရှိဆေးရည်ကို ၂-၃ ရက် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆေးရည်ညစ်ညမ်းလာပါကလဲစေးပါ။
- ဆေးဖျန်းခြင်းကိုဆေးဖျန်းစက် (Fogging machine) နှင့်သုံးပါက ဒက်စစ်-၄၀၀ ၁ လီတာ နှင့် ရေ ၉ ဂါလင်ရေပြီး ဖျန်းပါက ၂၀၀၀ ကုဗမီတာ (၇၀၆၀၀ ကုဗပေခန့်) အတွက် လုံလောက်ပါသည်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၁၀၀၀ စီစီ





Dexon-100

အက်စွန်-၁၀၀
ပိုးသတ်ဆေးမျှန်

ပါဝင်မှု

Potassium peroxymonosulphate..... 35 - 55%

ဆေးညွှန်း

အက်စွန်-၁၀၀ ပိုးသတ်ဆေးသည် ဝိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၊ ဗက်တီးရီးယားပိုးများ၊ မှိုများကိုထိရောက်လျင်မြန်စွာ သေဆုံးစေပါသည်။ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များတွင်အဖြစ်များသော လည်လိမ်ရောဂါ (ND)၊ အိုင်ဘီရောဂါ (IB)၊ အိုင်ဘီဘီရောဂါ (IBD)၊ မားရက်ရောဂါ (Marek)၊ အိုင်အယ်လ်တီရောဂါ (ILT)၊ ဥနှုန်းကျရောဂါ (EDS)၊ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးရောဂါ (AI)၊ လျှာနာရွာနာရောဂါ (FMD)၊ နားရွက်ပြာရောဂါ (PRRS)၊ ဝက်ပါးစပ်နာရောဂါ (SVD) ဖြစ်စေသောဝိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးပိုးသတ်ဆေးများတွင် အန္တရာယ်အနည်းဆုံး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုအနည်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ရောဂါကျရောက်စဉ် တိရစ္ဆာန်များဖယ်ရှားခြင်းမပြုပဲ ဖျန်းနိုင်ပါသည်။ လုံးဝအန္တရာယ်မရှိ ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အန္တရာယ်နည်းသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။ လိုအပ်သောအကာကွယ်ပြုလုပ် ပြီးသုံးစွဲသင့်ပါသည်။ မလိုအပ်ပဲ မြေထဲရေထဲသို့မကျရောက်စေသင့်ပါ။

သုံးစွဲပုံ

- မွေးမြူရေးခြံ ပိုးသတ်ခြင်းအတွက် ဆေး ၁ ကီလိုဂရမ်ကို ရေ ၁၀၀ လီတာနှင့်ရောစပ်ပြီးသုံးစွဲပါ။ ဖိအားမြင့်ရေဆေးစက် (pressure washer) သုံးပါကဖျော်စပ်ပြီး ဆေး ၂၅၀-၃၀၀ စီမီကို ၁ စတုရန်းမီတာနှုန်းဖျန်းပါ။
- လေထဲသို့ရေမှန်အနေနှင့် ဖျန်းခြင်း (misting) အတွက်ဆေး ၁ ကီလိုဂရမ်ကို ရေ ၃၀၀ လီတာနှုန်းရောစပ်ပြီးသုံးပါ။
- လေထဲသို့မြူမှုန်အနေနှင့် ဖျန်းခြင်း (fogging) အတွက် ဆေး ၁ ကီလိုဂရမ်ကို ရေ ၂၀ လီတာနှင့်ရောစပ်ပြီးသုံးပါ။
- သောက်သုံးရေပိုးသတ်ရန် ဆေး ၅၀ ဂရမ်ကို ရေ ၅၀ လီတာနှင့်ဖျော်ပါ။
- ရေပိုက်လိုင်းများတွင်ကပ်ငြိနေသော အညှို့များဖယ်ရှားရန် ဆေး ၁ ကီလိုဂရမ်ကို ရေ ၁၀၀ လီတာနှုန်းဖျော်စပ်ပြီး ပိုက်လိုင်းအတွင်း မိနစ် ၃၀ ထားပြီးမှရေပြန်ထုတ်ပါ။ ရောစပ်ထားသောဆေးရေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဖြည့်ပြီး မိနစ် ၃၀ ထားပြီးရေပြန်ထုတ်ပါ။
- ယာဉ်နှင့်ပစ္စည်းများဆေးကြောရန် ဆေး ၁ ကီလိုဂရမ်ကိုရေ ၁၀၀ လီတာနှုန်းဖျော်၍ ဖိအားမြင့်ရေဆေးစက်ဖြင့်ဆေးပါ။ ခြေထောက်နှင့်ကားဘီးများဖြတ်ရန် ကန်များအတွက်ဆေး ၁ ကီလိုဂရမ် ရေ ၁၀၀လီတာနှုန်းဖျော်ပြီး သုံးပါ။ ဆေးရေအလွန်ညစ်ညမ်းလာလျှင်သို့မဟုတ်တစ်ပတ်လျှင် တကြိမ်အသစ်လဲပါ။

အက်စွန်-၁၀၀ သည်ရေတွင်ဖျော်ထားပြီးပါက အာနိသင်မပျက်ပဲ ၇-ရက် အထိထားနိုင်ပါသည်။

ထုပ်ပိုးပုံ

၅၀၀၀ ဂရမ်





ဆေးအာနိသင်ကုန်ဆုံးမည့်ရက်

ဆေးအမည်	အမဲ/ဆိတ်	ဝက်	ကြက်	ဥ
အလီဆရီလ် ရေဖျော်	၇ ရက်	၇ ရက်	၇ ရက်	၁ ရက်
အမိပရိုကောက်စ် ရေဖျော်	၁၄ ရက်	၁၄ ရက်	၁၄ ရက်	
ကိုလီ-၄၈၀၀ ရေဖျော်	၇ ရက်	၇ ရက်	၇ ရက်	
ကိုလောက်စန့် ရေဖျော်	၁၄ ရက်	၈ ရက်	၇ ရက်	
ဒိုင်မောက်စန့် ရေဖျော်	၈ ရက်	၈ ရက်	၈ ရက်	
ဒေါက်စင်-၂၀၀ ရေဖျော်	၁၄ ရက်	၈ ရက်	၇ ရက်	
ဒေါက်စီ-၅၀၀ ရေဖျော်	၁၄ ရက်	၈ ရက်	၇ ရက်	
ဂယ်လီမစ်-၂၀၀ ရေဖျော်			၃ ရက်	၆ ရက်
ဂျင်တာ-၂၀၀ ရေဖျော်	၂၁ ရက်	၂၁ ရက်	၂၁ ရက်	၃ ရက်
ဂျင်တာဒေါက်စ် ရေဖျော်	၁၄ ရက်	၈ ရက်	၇ ရက်	
အင်တာထရင်-၄၈၀ ရေဖျော်	၈ ရက်	၈ ရက်	၅ ရက်	
လင်မောက်စင် ရေဖျော်	၈ ရက်	၈ ရက်	၆ ရက်	
မက်ခရိုလင် ရေဖျော်	၅ ရက်	၃ ရက်	၅ ရက်	
နီမိုဗစ် ရေဖျော်	၇ ရက်	၇ ရက်	၇ ရက်	၁ ရက်
နီယိုမစ်-၇၀၀ ရေဖျော်	၂၁ ရက်	၂၁ ရက်	၇ ရက်	
ကိုလက်စင် ဆေးရည်	၇ ရက်	၇ ရက်		
ကိုလက်စီလ် ဆေးရည်	၉ ရက်	၉ ရက်	၉ ရက်	
ကိုလီ-၂၄၀၀ ဆေးရည်	၇ ရက်	၇ ရက်	၇ ရက်	
ကိုလောက်စန့် ဆေးရည်	၁၄ ရက်	၈ ရက်	၇ ရက်	
ဒေါက်စီဆောလ် ဆေးရည်		၇ ရက်	၇ ရက်	
အင်တာဖလောက်စ် ဆေးရည်	၁၂ ရက်	၁၂ ရက်	၁၂ ရက်	
အင်တာမက်တင် ဆေးရည်	၁၄ ရက်	၁၄ ရက်	၁၄ ရက်	
အင်တာထရင်-၄၈၀ ဆေးရည်	၈ ရက်	၈ ရက်	၅ ရက်	
မက်ခရိုတိုင် - ၂၅၀ ဆေးရည်	၄၂ ရက်	၁၄ ရက်	၁၂ ရက်	



ဆေးအာနိသင်ကုန်ဆုံးမည့်ရက်

ဆေးအမည်	အဖဲ/ဆိတ်	ဂက်	နို့
ဘိုင်အိုစီလင်-၁၅၀ ထိုးဆေး	၂၁ ရက်	၂၁ ရက်	၃ ရက်
ဖလူကိုနှစ်-၃၄၀ ထိုးဆေး	၆၀ ရက်		
ဂျင်တာ-၁၀၀ ထိုးဆေး	၇ ရက်	၇ ရက်	၃ ရက်
ဂလူကော်တင်-၂၀ ထိုးဆေး	၃ ရက်	၃ ရက်	၁ ရက်
အင်တာဖလောက်စ်-၁၀၀ ထိုးဆေး	၂၁ ရက်	၁၄ ရက်	၄ ရက်
အင်တာမက်တင် ထိုးဆေး	၂၈ ရက်	၂၁ ရက်	
အင်တာထရင် ထိုးဆေး	၁၂ ရက်	၁၂ ရက်	၄ ရက်
ကီတိုဆောလ်-၁၀၀ ထိုးဆေး	၄ ရက်	၄ ရက်	
လင်မောက်စင်-၅၀ ထိုးဆေး	၁၂ ရက်	၁၂ ရက်	၅ ရက်
လင်မောက်စင်-၂၀၀အယ်လ်အေထိုးဆေး	၂၈ ရက်	၂၈ ရက်	၇ ရက်
မက်ခရိုလင်-၂၀၀ ထိုးဆေး	၁၀ ရက်	၁၀ ရက်	၃ ရက်
ပင်စထရက်-၄၀၀ ထိုးဆေး	၂၁ ရက်	၂၁ ရက်	၃ ရက်
ပရိုကာဗင်-အယ်လ်အေ ထိုးဆေး	၁၄ ရက်	၁၄ ရက်	၃ ရက်
ဇိုင်လာ ထိုးဆေး	၅ ရက်	၅ ရက်	၄ ရက်
ဘိုင်အိုပိုင်စင်-အမ်	၅ ရက်		၃ ရက်
ထရစ်ပိုနီး ထိုးဆေး	၂၁ ရက်	၂၁ ရက်	၄ ရက်

တွက်ချက်မှုစံညွှန်းများ

- ၁ ကီလို ၂.၂၅ ပေါင်
- ၁ ကီလို ၆၁.၂၅ ကျပ်သား
- ၁ ဂရမ် ၀. ၀၆ ကျပ်သား
- ၁ ဂါလံ ၄.၅၄ လီတာ
- ၁ လီတာ ၀.၂၂ ဂါလံ